

PLpro प्रोटीन और SARS-CoV-2 वायरस

प्रिलमिंस के लिये:

PLpro प्रोटीन, SARS-CoV-2 और मानव प्रतारिका प्रणाली, T-सेल, इंटरफेरॉन, NK सेल

मेन्स के लिये:

मानव प्रतारिका तंत्र

चर्चा में क्यों?

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में उत्पन्न वशेष प्रोटीन पीएलप्रो (PLpro) की पहचान की है, जो SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण के दौरान मानव में उत्पन्न होता है तथा वायरस के प्रतिकृति निर्माण में मदद करता है।

प्रमुख बडि:

- जब कोरोनावायरस- SARS-CoV-2 मानव कोशिका में प्रवेश करता है तो यह शरीर के कोशिका तंत्र को नयितरति कर लेता है।
- इस वायरस के शरीर में प्रवेश करने पर मानव कोशिका तंत्र द्वारा वशेष प्रकार का प्रोटीन; जनिहें PLpro कहा जाता है, नरिमति होता है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वायरस की प्रतिकृति निर्माण के लिये यह PLpro प्रोटीन आवश्यक होता है।

SARS-CoV-2 के खिलाफ मानव प्रतारिका प्रणाली:

- जब SARS-CoV-2 वायरस से मानव शरीर संक्रमति होता है, तो संक्रमति शरीर की कोशिकाओं द्वारा 'टाइप-1 इंटरफेरॉन' नामक संदेशवाहक पदार्थ मुक्त कथिा जाता है। ये संदेशवाहक पदार्थ शरीर की मारक कोशिकाओं (Killer Cells) या NK सेल को आकर्षति करते हैं और संक्रमति कोशिकाओं को खतम करते हैं।
- मानव कोशिकाओं द्वारा PLpro प्रोटीन का उत्पादन प्रारंभ होने पर SARS-CoV-2 वायरस पुनः प्रतारिका प्रणाली के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, कयोंकि PLpro प्रोटीन टाइप 1 इंटरफेरॉन के नरिमाण को प्रभावति करता है। इससे शरीर की मारक कोशिकाओं या NK कोशिकाओं को आकर्षति करने की क्षमता कम हो जाती है तथा शरीर वायरस से रोग ग्रस्त हो जाता है।

शोध का महत्त्व:

- वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कथिद PLpro प्रोटीन नरिमाण को औषधीय तरीकों से रोक (ब्लॉक) दथिा जाता है तो वायरस की प्रतिकृति निर्माण प्रक्रथिा भी रुक जाती है और हमारी प्रतारिका प्रतिक्रथिा प्रणाली भी मज़बूत होती है।
- शोधकर्त्ता अब 'सेल कल्चर' (कृत्रमि वातावरण) में इन प्रक्रथिाओं की नगिरानी कर सकते हैं।

वायरस के खिलाफ प्रतारिका प्रतिक्रथिा (Immune Responses to Viruses):

T सेल:

- जब एक वायरस कसिी व्यक्तिको संक्रमति करता है, तो यह जीवति रहने और अपनी प्रतिकृति निर्माण के लिये मेज़बान कोशिकाओं पर हमला करता है।
- इस दौरान प्रतारिका प्रणाली की वशेष कोशिकाएँ; जनिहें T सेल कहा जाता है, संक्रमति कोशिकाओं की तलाश करती है।


- 'T सेल रसिप्टर' वायरस से उत्पन्न पेप्टाइड (संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित कारक) का पता लगाता है तथा T सेल को संक्रमण की चेतावनी देता है।
- 'T सेल' संक्रमित कोशिका को नष्ट करने के लिये साइटोटोक्सिक कारक (Cytotoxic Factors) नामक प्रोटीन मुक्त करता है जो वायरस को नष्ट कर देता है।

NK सेल:

- वायरस में अनुकूलन की अत्यधिक क्षमता होती है जो 'T सेल' की पहचान से बचने के लिये नवीन तरीके विकसित कर लेता है तथा T सेल संक्रमित कोशिकाओं का पता नहीं लगा पाती है।
- जब T सेल संक्रमित कोशिकाओं का पता नहीं लगा पाती है तो यह कार्य शरीर की विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं; जिन्हें 'प्राकृतिक मारक कोशिका' (Natural Killer Cell) या संक्षेप में NK सेल कहा जाता है, द्वारा संपन्न किया जाता है।

इंटरफेरॉन (Interferons):

- वायरस से संक्रमित होने पर कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है जो वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इंटरफेरॉन संक्रमित कोशिका में वायरस की प्रतिकृति निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके इसे रोकते हैं।
- इंटरफेरॉन संक्रमित कोशिकाओं के संकेतक अणुओं के रूप में भी कार्य करते हैं तथा निकट की कोशिकाओं में वायरस की उपस्थिति के संबंध में चेतावनी देते हैं।



स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

