

वायु गुणवत्ता में कमी समय-पूर्व मृत्यु का कारण

चर्चा में क्यों?

उत्तर भारत के 11 शहरों में किये गए एक नए अध्ययन में कहा गया है कि वायु गुणवत्ता में कमी पछिले दो दशक में समय से पूर्व मृत्यु के प्रमुख कारण के रूप में सामने आया है।

महत्वपूर्ण बन्दि

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली ने सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (Centre for Environment and Energy Development- CEED) नामक पर्यावरणीय NGO के साथ मलिकर 'know what you breathe' शीर्षक से, ये नषिकर्ष जारी किये हैं।
- इस रपौर्ट के अनुसार, प्रतिएक लाख की आबादी पर 150-300 व्यक्तियों की वार्षिकी मृत्यु दर पाई गई।
- इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश के सात शहरों (इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी और गोरखपुर), बहिर के तीन (पटना, गया और मुज़फ्फरपुर) तथा झारखण्ड की राजधानी राँची को शामिल कया गया था।
- कानपुर में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली समय-पूर्व मृत्यु की दर सबसे अधिक (4,173 प्रतवर्ष) पाई गई। इसके बाद क्रमशः लखनऊ में (4,127 प्रतवर्ष), आगरा में (2,421 प्रतवर्ष), मेरठ में (2,044 प्रतवर्ष), वाराणसी में (1,581 प्रतवर्ष), इलाहाबाद में (1,443 प्रतवर्ष) तथा गोरखपुर में (914 प्रतवर्ष) की मृत्यु दर पाई गई।
- इस अध्ययन में, शहर में क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डज़िज़ (COPD), तीव्र श्वसन संक्रमण (ALRI), कोरोनरी डज़िज़, दौरा तथा फेफड़े के कैंसर के कारण होने वाली औसत वार्षिकी मौतों का अध्ययन कया गया।
- COPD के कारण होने वाली मौतें सर्वाधिक तथा फेफड़े के कैंसर से होने वाली मौतें सबसे कम पाई गईं।
- ALRI के कारण मेरठ तथा आगरा में सर्वाधिक मौतें हुईं जबकि COPD के कारण इलाहाबाद, गया, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, पटना, मुज़फ्फरपुर और वाराणसी में सबसे अधिक मौतें हुईं।
- रपौर्ट के अनुसार, यदि वायु की गुणवत्ता में सुधार हो जाए, तो इन मृत्यु दरों में 14% से 28% तक कमी हो सकती है।
- पछिले 17 वर्षों से वायु में उपस्थिति कणों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट आधारित उच्च-रज़ॉल्यूशन PM 2.5 डेटाबेस का उपयोग करते हुए, इस रपौर्ट में नषिकर्ष निकाला गया है कि अध्ययन में शामिल 11 में से 10 शहरों में PM 2.5 का वसितार तेज़ी से हुआ है।