

चाँदीपुरा वायरस

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, राज्य में चाँदीपुरा वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है।

- इससे पहले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में वायरल संक्रमण एवं [एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम \(Acute Encephalitis Syndrome- AES\)](#) के मामलों की समीक्षा की।

मुख्य बटु

- सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के पास इस वायरस की पहचान करने के लिये सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएँ उपस्थित हैं, जो AES के कारणों में से एक है।
- एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) चकित्सकीय रूप से समान तंत्रिका संबंधी अभवियक्तियों का एक समूह है, जो कई अलग-अलग [वायरस](#), [बैक्टीरिया](#), [कवक](#), [परजीवी](#), [स्पाइरोकेट्स](#), [रसायनों/वषिकत पदार्थों](#) आदि के कारण होता है।
- AES के ज्ञात वायरल कारणों में [जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस \(JEV\)](#), [डेंगू](#), [हर्पीज समिप्लेक्स वायरस](#) और [वेस्ट नाइल](#) आदि शामिल हैं।

चाँदीपुरा वायरस (CHPV)

- यह [रैबडोविरिडि फ़ैमिली](#) का सदस्य है, जो देश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में, विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान, [छोटे स्तर के मामलों तथा प्रकोप](#) का कारण बनता है।
 - यह बीमारी रेत [मक्खियों](#) और [टकिस जैसे वेक्टरों द्वारा संक्रमित](#) होती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वेक्टर नयित्रण, स्वच्छता और जागरूकता ही इस बीमारी के वरिद्ध उपलब्ध एकमात्र उपाय है।
- वायरस के कारण होने वाला संक्रमण [केंद्रीय तंत्रिका तंत्र](#) तक पहुँच सकता है, जिससे [एन्सेफलाइटिस \(Encephalitis\)](#) हो सकता है- मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन।
- [रोग की प्रगति इतनी तीव्र हो सकती है](#) कि रोगी को सुबह तीव्र बुखार हो सकता है तथा शाम तक गुरदे या यकृत प्रभावित हो सकते हैं।
- यह संक्रमण मुख्यतः [15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक ही सीमित](#) रहा है।
- लक्षण:**
 - CHPV संक्रमण में शुरु में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे- [तीव्र बुखार](#), [शरीर में दर्द और सरिदर्द](#)।
 - इसके बाद यह [संवेदी अंगों में परविरतन या मरिगी \(एपलिप्सी\)](#) और [एन्सेफलाइटिस \(दमिगी बुखार\)](#) का रूप ले सकता है।
 - श्वसन संबंधी परेशानी, रक्तस्राव की प्रवृत्तियाँ [एनीमिया](#)
 - एन्सेफलाइटिस के बाद संक्रमण अक्सर तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होने के 24-48 घंटों के भीतर मृत्यु हो सकती है।
- उपचार:**
 - इस संक्रमण का [प्रबंधन केवल लक्षणात्मक रूप से ही कथिा जा सकता है](#), क्योंकि [वर्तमान में इसके उपचार के लिये कोई वशिष्ट एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी या टीका उपलब्ध नहीं है](#)।