

## पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता

### स्रोत: डाउन टू अर्थ

अरब देशों में शावकों के अवैध व्यापार के कारण पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता को आनुवंशिक विविधता में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है।



## पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीतों के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- वैज्ञानिक नाम: एसिनोनक्स जुबेटस सोमेरिंगी (Acinonyx jubatus soemmeringii)
- परिचय:
  - यह चीता की एक उप-प्रजाति है जिससे पहली बार वर्ष 1855 में ऑस्ट्रियाई जीवविज्ञानी लियोपोल्ड फटिज़गिर द्वारा वैज्ञानिक नाम **सिनिलुरस सोमेरिंगी (Cynailurus soemmeringii)** के तहत सूडान के बायुडा रेगस्तान से वथिना में टयिरगार्टन शॉनबुरुन में लिये गए एक नमूने के आधार पर देखा गया था।
  - इसे **सूडान चीता** के नाम से भी जाना जाता है। यह उप-प्रजाति सहारन चीता आबादी के बजाय **दक्षिणी अफ्रीकी चीता** आबादी से संबंधित है।
- वितरण:
  - ये पूर्वोत्तर अफ्रीका, इथियोपिया और दक्षिण सूडान में पाए जाते हैं।
  - ये वसित्तु खुली भूमि, घास के मैदानों, अर्ध-शुष्क क्षेत्रों और अन्य खुले आवासों में रहते हैं, जहाँ शिकार प्रचुर मात्रा में होता है जैसे कि पूर्वी सूडानी सवाना क्षेत्र में।
- आवास:
  - उनके आवासों में आम तौर पर विभिन्न प्रकार के पारस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं, जैसे- सवाना, घास के मैदान और अर्ध-शुष्क स्थान, अक्सर वरिल वनस्पतियों के साथ जो उनकी उच्च गति शिकार रणनीति के लिये सक्षम होते हैं।
- खतरा:
  - **लाल सागर (Red sea)** के पार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे अरब देशों में उनकी भारी तस्करी की जाती है।

- नविस स्थान के नुकसान, मानव अतिक्रमण और शिकार के कारण, उनकी संख्या में काफी कमी आई है, मुख्य रूप से संरक्षण क्षेत्रों में केवल कुछ बखिरी हुई आबादी बची है।
- संरक्षण की स्थिति:
  - **IUCN रेड लिस्ट:** लुप्तप्राय।

# चीता (Cheetah)



**सामान्य नाम:** एशियाई चीता

**वैज्ञानिक नाम:** एसिनोनिक्स जुबेटस (*Acinonyx jubatus*)

- ◆ एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस (एशियाई चीता)
- ◆ एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस (अफ्रीकी चीता)

**विशेषताएँ:**

- ◆ विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी
- ◆ चीते अपनी क्षमता के बजाय गति के लिये जाने जाते हैं; जब ये अपने शिकार का पीछा करते हैं तो यह केवल **200-300** मीटर के लिये तथा **1** मिनट से कम अवधि का होता है।
- ◆ शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिये चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान शिकार करते हैं।

**अफ्रीकी चीता बनाम एशियाई चीता:**

- ◆ **अफ्रीकी:** हल्के भूरे और सुनहरे रंग की त्वचा; एशियाई चीते से मोटी
  - ◆ चेहरों पर धब्बों तथा रेखाओं की प्रधानता
  - ◆ पूरे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं
  - ◆ **IUCN रेडलिस्ट में स्थिति:** सुभेद्य (**Vulnerable**)
- ◆ **एशियाई:** अफ्रीकी चीतों से थोड़े छोटे
  - ◆ हल्के पीले रंग की त्वचा: शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट पर अधिक बाल
  - ◆ केवल ईरान में पाए जाते हैं; देश द्वारा यह दावा किया जाता है कि अब यहाँ केवल **12** चीते शेष हैं।
- ◆ वर्ष **1952:** एशियाई चीता को आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त घोषित किया गया
  - ◆ **IUCN रेडलिस्ट में स्थिति:** घोर संकटग्रस्त (**Critically Endangered**)



एशियाई चीता



अफ्रीकी चीता

**भारत में चीतों का पुनर्वास:**

- ◆ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 19वीं बैठक में MoEF-CC द्वारा "भारत में चीता पुनर्वास के लिये कार्ययोजना" जारी की गई थी। (जनवरी **2022**)
  - ◆ इसी तरह की एक कार्ययोजना सर्वप्रथम वर्ष **2009** में प्रस्तावित की गई थी।
- ◆ सितंबर **2022** में नामीबिया से आठ चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु लाया गया।
  - ◆ इन आठ चीतों को मध्यप्रदेश के कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा।
- ◆ नामीबिया से भारत में चीतों का स्थानांतरण विश्व भर में किसी बड़े मांसाहारी जानवर की पहली स्थानांतरण परियोजना है।



