

## हैडरॉन कोलाइडर रन 3

### प्रलिस के लयि:

हैडरॉन कोलाइडर, पार्टकिल फजिकिस, गॉड पार्टकिल, बगि बैंग थयोरी, CERN

### मेन्स के लयि:

पदार्थ का वकिस, LHC का महत्त्व, कण भौतिकी का महत्त्व, भौतिकी के मानक मॉडल की अवधारणा

## चर्चा में क्यों?

[यूरोपयिन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रसिर्च \(CERN\)](#) ने गॉड पार्टकिल कहे जाने वाले हगिस बोसॉन की खोज के 10 साल बाद जुलाई 2022 में एक बार फरि से [लार्ज हैडरॉन कोलाइडर](#) को चालू कयि है ।

## लार्ज हैडरॉन कोलाइडर

### परचिय:

- लार्ज हैडरॉन कोलाइडर एक वशाल, जटलि मशीन है जसि उन कणों का अधयन करने के लयि बनाया गया है जो सभी चीज़ों के सबसे छोटे ज्ञात मूलभूत अंग हैं ।
- अपनी परचालन अवस्था में यह सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एक रगि के अंदर वपिरीत दशाओं में प्रकाश की गतिसे लगभग दो प्रोटॉनों को फायर करता है ।
- सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द्वारा बनाया गया चुंबकीय कषेत् प्रोटॉन को एक तंग बीम में रखता है और उन्हें रास्ते में मार्गदर्शन करता है ये बीम पाइप के माध्यम से यात्रा करते हैं और अंत में टकराते हैं ।
- चूँकि LHC के शक्तशाली वदियुत चुंबकों में अत्याधिक मात्रा में वदियुत धारा प्रवाहति होती है, इसलिये इसे ठंडा रखा जाना आवशयक है ।
  - LHC में महत्त्वपूर्ण घटकों को 0 से 271.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अल्ट्राकोल्ड रखने के लयि तरल हीलियम की वतिरण प्रणाली का उपयोग होता है, जो इंटरस्टेलर स्पेस की तुलना में ठंडा है ।

### नवीनतम अपग्रेड:

- यह LHC's का तीसरा रन है, यह 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट (इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को वदियुत वभिवांतर के 1 वोल्ट के माध्यम से त्वरति करके दी जाती है) के अभूतपूर्व ऊर्जा स्तरों पर चार साल के लयि चौबीसों घंटे काम करेगा ।
- ATLAS और CMS प्रयोगों के लयि वैज्ञानिक प्रतिसेकंड 1.6 बलियन प्रोटॉन-प्रोटॉन टकराव का लक्ष्य बना रहे हैं ।
  - ATLAS: LHC पर सबसे बड़ा सामान्य प्रयोजन कण डिटिक्टर प्रयोग ।
  - CMS: इतिहास में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोगों में से एक है, जसिमें एटलस के समान लक्ष्य हैं, लेकिन जो एक अलग चुंबक-प्रणाली डिज़ाइन का उपयोग करता है ।

### महत्त्व:

- भौतिक वज्जानी छोटे पैमाने पर ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने हेतु और डार्क मैटर की प्रकृति जैसे रहस्यों को सुलझाने के लयि टकरावों का उपयोग करना चाहते हैं ।
- LHC का उद्देश्य भौतिकविदों को कण भौतिकी के वभिन्न सदिधांतों की भवषियवाणियों का परीक्षण करने की अनुमति देना है ,
  - कण त्वरक में पाई जाने वाली तकनीक का उपयोग पहले से ही कुछ प्रकार की कैंसर सर्जरी आदि के लयि कयि जाता है ।

## LHC के पछिले चरणों का प्रदर्शन:

### पहला चरण:

- एक दशक पहले सर्न ने LHC के पहले चरण के दौरान दुनयिा को **हगिस बोसॉन** या **'गॉड पार्टकिल'** की खोज की घोषणा की थी ।
  - इस खोज ने 'बल-वाहक' उप-परमाणु कण के लिये दशकों से चली आ रही खोज के नषिकर्षों को गलत साबति कर दयिा था और हगिस तंत्र के अस्तित्व को साबति कर दयिा था ।

- इसके कारण पीटर हगिस और उनके सहयोगी फ्रांस्वा एंगलर्ट को 2013 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- माना जाता है कि हगिस बोसोन और उससे संबंधित ऊर्जा क्षेत्र ने ब्रह्मांड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

#### ■ दूसरा चरण:

- यह वर्ष 2015 में शुरू हुआ और वर्ष 2018 तक चला। डेटा प्राप्त के दूसरे चरण ने पहले चरण की तुलना में पाँच गुना अधिक डेटा प्रदान किया।

### गॉड पार्टिकल:

- वर्ष 2012 में हगिस बोसोन (जैसे 'गॉड पार्टिकल' के रूप में भी जाना जाता है) की नोबेल विजेता खोज ने **भौतिकी के मानक मॉडल** को मान्य किया, जो यह भी भविष्यवाणी करता है कि लगभग 60% हगिस बोसोन पेयर बॉटम क्वार्क में क्षय हो जाएगा।
- वर्ष 1960 के दशक में पीटर हगिस यह सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति थे कि यह कण मौजूद हो सकता है।
  - हगिस क्षेत्र को वर्ष 1964 में नए प्रकार के क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया था जो पूरे ब्रह्मांड को भरता है और सभी प्राथमिक कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। इसकी खोज हगिस क्षेत्र के अस्तित्व की पुष्टि करती है।
- **भौतिकी का मानक मॉडल:**
  - कण भौतिकी का मानक मॉडल वह सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में चार ज्ञात मौलिक बलों (वैद्युत चुंबकीय, कमजोर और मजबूत अंतःक्रिया तथा गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति) में से तीन का वर्णन करता है, साथ ही सभी ज्ञात प्राथमिक कणों को वर्गीकृत करता है।
    - यह जानकारी देता है कि कैसे **क्वार्क** नामक कण (जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं) तथा **लेप्टॉन** (जिसमें इलेक्ट्रॉन शामिल हैं) सभी ज्ञात पदार्थ का निर्माण करते हैं।
    - साथ ही यह भी जानकारी देता है कि कैसे बल कण को प्रभावित करता है, जो बोसॉन के एक व्यापक समूह से संबंधित हैं और क्वार्क तथा लेप्टॉन को प्रभावित करते हैं।
  - वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जानते हैं कि मानक मॉडल के साथ गुरुत्वाकर्षण को कैसे जोड़ा जाए।
- हगिस कण बोसॉन है।
  - बोसॉन को ऐसे कण माना जाता है जो सभी भौतिक बलों के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
  - अन्य ज्ञात बोसॉन फोटॉन, डबल्यू और जेड बोसॉन तथा ग्लूऑन हैं।

### भारत और CERN

- भारत 2016 में यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (CERN) का सहयोगी सदस्य बना।
- CERN के साथ भारत का जुड़ाव लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के साथ दशकों पुराना है, हार्डवेयर एक्सेलेरेटर घटकों / प्रणालियों के डिज़ाइन, विकास व आपूर्ति एवं मशीन में इसकी कमीशनिंग और सॉफ्टवेयर विकास तथा तैनाती के क्षेत्रों में।
- भारत को वर्ष 2004 में CERN में 'पर्यवेक्षक' के रूप में शामिल किया गया था। सहयोगी सदस्य के रूप में इसका उन्नयन भारतीय कंपनियों को आकर्षक इंजीनियरिंग अनुबंधों के लिये बोली लगाने की अनुमति देता है और भारतीय संगठन में सटाफ पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- सहयोगी सदस्यता पर भारत का सालाना लगभग 78 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, हालाँकि अभी भी परिषद के निर्णयों पर मतदान का अधिकार नहीं होगा।
- भारतीय वैज्ञानिकों ने एलार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट (ALICE) और कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड (CMS) प्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण हगिस बोसोन की खोज हुई।

### यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. नकिट अतीत में हगिस बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिये किये गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्त्व है? (2013)

- हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संतुलन क्यों होती है।
- यह नकिट भविष्य में हमें दो बट्टियों के बीच के भौतिक अंतराल को पार किये बिना एक बट्टि से दूसरे बट्टि तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा।
- यह हमें नाभिकीय वखिंडन के लिये बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: A

## व्याख्या:

- यूनफाइड थ्योरी के बुनियादी समीकरणों ने इलेक्ट्रो-कमज़ोर बल और उससे जुड़े बल-वाहक कणों, अर्थात् फोटॉन एवं डब्ल्यू तथा ज़ेड बोसॉन का वर्णन किया। ये सभी कण बिना द्रव्यमान के निकले। प्रोटॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, लेकिन डब्ल्यू व ज़ेड का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 100 गुना होता है।
- सिद्धांतवादी रॉबर्ट ब्राउट, फ्रैंकोइस एंगलर्ट और पीटर हग्स ने एक सिद्धांत दिया जिसे ब्राउट-एंगलर्टहग्स तंत्र के रूप में जाना जाता है जो डब्ल्यू व ज़ेड को अदृश्य क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया करते समय एक द्रव्यमान प्रदान करता है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसे "हग्स क्षेत्र" कहा जाता है। हग्स बोसॉन हग्स क्षेत्र की दृश्यमान अभिव्यक्ति है।
- बगि बैग के ठीक बाद हग्स क्षेत्र शून्य था, लेकिन जैसे-जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया और तापमान एक महत्वपूर्ण मान से नीचे गिर गया, यह क्षेत्र अनायास ही बढ़ गया ताकि इसके साथ अंतःक्रिया करने वाले किसी भी कण का द्रव्यमान प्राप्त हो जाए।
- एक कण जितना अधिक इस क्षेत्र के साथ संपर्क करता है, वह उतना ही भारी होता है, जैसे क्वार्क जो इसके साथ अंतःक्रिया नहीं करता है, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है।
- सभी मूलभूत क्षेत्रों की तरह हग्स क्षेत्र में एक संबद्ध कण हग्स बोसॉन होता है। **अतः कथन 1 सही है और हग्स बोसॉन कण का कथन 2 और 3 से कोई संबंध नहीं है।**

अतः विकल्प (A) सही उत्तर है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/hadron-collider-run-3>

