

## तपेदकि की रोकथाम में पोषण की भूमिका

### प्रलिमिस के लिये:

तपेदकि, ICMR, [नकिषय पोषण योजना](#)

### मेन्स के लिये:

तपेदकि उन्मूलन की चुनौतियाँ, तपेदकि उन्मूलन में भारत की प्रगति

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय चकितिसा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा किया गए और द लांसेट और द लांसेट ग्लोबल हेल्थ जैसी प्रतिष्ठित पत्रकाओं में प्रकाशित दो अध्ययनों में पोषण तथा तपेदकि की रोकथाम के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध का खुलासा किया गया है।

- पोषण संबंधी स्थिति में सुधार द्वारा तपेदकि की सक्रियता को कम करना (**Reducing Activation of Tuberculosis by Improvement of Nutritional Status- RATIONS**), परीक्षण पोषण संबंधी सहायता तथा तपेदकि की घटनाओं में कमी के बीच संबंध को दर्शाता है।
- तपेदकि मृत्यु दर पर वज़न बढ़ने के प्रभाव संबंधी अध्ययन से यह समझने में मदद करता है कि कुपोषित तपेदकि रोगियों में बढ़ा हुआ वज़न मृत्यु दर में कमी के साथ किसी प्रकार संबंधित है।

### नोट:

- WHO के अनुसार, वैश्विक तपेदकि मामलों में भारत का योगदान 27% है और यह तपेदकि से संबंधित कुल मौतों का 35% है।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक तपेदकि को पूरी तरह से खत्म करना है।

### अध्ययन के प्रमुख बिंदु:

- इस अध्ययन के अनुसार कुल 5,621 लोगों को एक वर्ष के लिये पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन दिया गया, जबकि 4,724 लोगों को बनियासी अतरिक्लिप पोषण वाले खाद्य पदार्थ दिये गए।
  - परीक्षण में पाया गया किंजिसि समूह को पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन दिया गया, उनमें टीबी की घटनाओं में 39% की कमी आई।
- वज़न बढ़ने से झारखंड में गंभीर रूप से कुपोषित टीबी रोगियों में तपेदकि मृत्यु दर के जोखिम में कमी आई है।
  - 1% वज़न बढ़ने पर मृत्यु का तात्कालिक जोखिम 13% कम हो गया तथा 5% वज़न बढ़ने पर 61% कम हो गया।
- इस अध्ययन में झारखंड में गंभीर रूप से कुपोषित 2,800 टीबी रोगियों को शामिल किया गया, जिनमें से 5 में से 4 रोगियों में अल्पपोषण की व्यापकता थी।
  - टीबी की दवाओं का असर वाले व्यक्तियों को छह महीने के लिये पोषण संबंधी सहायता प्रदान की गई, जबकि बहुऔषध-प्रतिरोधक तपेदकि (Multidrug-resistant TB or MDR-TB) से ग्रसित लोगों के लिये यह अवधि 12 महीने थी।
- पहले दो महीनों में जल्दी वज़न बढ़ने से टीबी से होने वाली मृत्यु का जोखिम 60% कम हो जाता है।
  - मरीज़ों में फॉलो-अप के दौरान उच्च उपचार सफलता, वज़न बढ़ना तथा वज़न घटने की कम दर देखी गई।

# Nutrition and Tuberculosis



● More than two-thirds of **trial participants were tribals**, most of whom were accessing ration from the PDS.

## ● Undernutrition

(BMI<18.5 kg/m<sup>2</sup>) was prevalent in four out of five patients, with severe undernutrition (BMI<16 kg/m<sup>2</sup>) in nearly half of these.

● Prevalence of HIV, diabetes, MDR-TB was low but **alcohol** and **tobacco use was high**.

● Nearly one per cent of patients were **hypotensive, hypoxic**, or were unable to stand, indicating need for in-patient care.

● One of three contacts across all ages had **undernutrition** at enrolment.

● There was a **39 per cent reduction** of incidence of **all forms of TB** and a **48 per cent reduction** of incidence of **infectious TB** in the intervention group of families.



Representative Image



## तपेदकि (Tuberculosis):

### ■ परचियः

- तपेदकि एक संक्रमण है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के कसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सबसे आम हैं- फेफड़े, फुसफुस (फेफड़ों के चारों ओर की परत), लम्फि नोड्स, आँत, रीढ़ और मस्तिष्क।

### ■ रोग का संचारः

- यह संक्रमण हवा से फैलता है जो संक्रमिति के नकिट संपर्क से फैलता है, खासकर खराब वेंटिलेशन वाले घनी आबादी वाले स्थानों में।

### ■ लक्षणः

- सक्रिय फेफड़े के टीबी के सामान्य लक्षण हैं बलगम वाली खाँसी और कभी-कभी खून आना, सीने में दरद, कमज़ोरी, वज़न कम होना, बुखार और रात में पसीना आना।

### ■ उपचारः

- टीबी एक उपचार योग्य बीमारी है।
- टीबी रोधी दवाओं का उपयोग दशकों से किया जा रहा है तथा सर्वेक्षण किये गए प्रत्येक देश मेंक या अधिक दवाओं के प्रतिप्रतिरोधी उपभोदों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

- 'बहुऔषध-प्रतिरोधक तपेदकि' (**Multidrug-resistant TB or MDR-TB**): जब कसी मरीज़ पर तपेदकि के इलाज के लिये उपयोग की जाने वाली दो सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं तो तपेदकि के ऐसे मामलों को MDR-TB के रूप में जाना जाता है।

- MDR-टीबी का उपचार बेड़ाक्वलिनि जैसी दूसरी पंक्तिकी दवाओं के उपयोग से संभव है।
- 'व्यापक रूप से डरग प्रतिरिधि तपेदकि' (Extensively Drug-Resistant TB or XDR-TB) MDR-टीबी का एक अधिक गंभीर रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है यह सबसे प्रभावी दूसरी पंक्तिकी एंटी-टीबी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, जसिसे अक्सर रोगियों को बना कर्सी अन्य उपचार के वकिलप के छोड़ दिया जाता है।

## टीबी से नपिटने के लिये भारत की पहल:

- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान।
- कषय रोग उन्मूलन (2017-2025) के लिये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP)
- टीबी हरेगा देश जीतेगा अभियान।
- नक्षय पोषण योजना।

## भारतीय चकितिसा अनुसंधान परिषद (ICMR):

- भारतीय चकितिसा अनुसंधान परिषद (ICMR) जैव चकितिसा अनुसंधान के नरिमाण, समन्वय एवं संवरद्धन के लिये भारत का शीर्ष नकिया है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1911 में इंडियन रसिर्च फंड एसोसिएशन (Indian Research Fund Association- IRFA) के नाम से हुई थी और वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया।
- यह भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्तपोषित है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nutrition-s-role-in-tuberculosis-prevention>