

बंगाल की खाड़ी में मैग्नेटिक फॉसलिस

प्रलम्बिस के लयि:

मैग्नेटिक फॉसलिस, मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, पृथ्वी का चुंबकीय कषेत्र, पेलयिोसीन-इओसीन थर्मल मैक्सिमि, मध्य इओसीन जलवायु मैक्सिमि, बंगाल की खाड़ी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परषिद, राष्ट्रीय समुद्र वजिज्ञान संसथान, इलेक्ट्रॉन माइक्रोसकोपी

मेन्स के लयि:

मैग्नेटो फॉसलिस के अधययन का महत्त्व ।

स्रोत: द हद्दि

चरचा में कयों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने **50,000 वर्ष पुरानी** तलछट (पानी या ओर कसी दरव पदार्थ के नीचे बैठी हुई मैल) का पता लगाया है, जो कि **बंगाल की खाड़ी** में पाया जाने वाला एक वशाल **मैग्नेटोफॉसलिस** है, यह अपनी तरह की सबसे दुर्लभ खोजों में से एक है ।

- **CSIR-राष्ट्रीय समुद्र वजिज्ञान संसथान** के वैज्ञानिकों ने बंगाल की दक्षिण-पश्चिमी खाड़ी से तलछट के नमूने का अधययन करने हेतु मैग्नेटिक वशिलेषण एवं इलेक्ट्रॉन माइक्रोसकोपी का उपयोग कयिा ।


अधययन के मुख्य नषिकरष कय्या हैं?

- **मानसून में उतार-चढाव:** तलछट के नमूनों का वशिलेषण करने पर पछिले हमिनद-होलोसीन अवधि के दौरान मानसून में उतार-चढाव का संकेत मलिा, जसिसे मौसम के उत्सादन एवं अवसादन पर प्रभाव पड्डा ।
- **मैग्नेटिक फॉसलिस वकिस हेतु इष्टतम सथतियिाँ:** अधययन से पता चलता है कि वशिल मैग्नेटोफॉसलिस नरिमाण के लयि जलवायु परविरतन की घटनाएँ आवशयक नही हैं; इसके सथान पर लौह, कारबनिक कारबन एवं सबऑक्सिक सथतियिों का संतुलन आवशयक है ।
- **मैग्नेटोफॉसलिस दवारा प्रापत की गई जानकारी:** मैग्नेटोफॉसलिस प्राचीन जलीय वातावरण में पोषक तत्त्वों की उपलब्धता, ऑक्सीजन के स्तर और जल स्तरीकरण सहति पछिली परयावरणीय सथतियिों के बारे में जानकारी को प्रापत करता है ।
 - **बंगाल की खाड़ी** में गरिने वाली गोदावरी, महानदी, गंगा-बरहमपुत्र, कावेरी और पेन्नर जैसी नदयिों ने **पोषक तत्त्वों से भरपूर तलछट** एवं प्रतक्रियशील लौह तत्त्व प्रदान करके मैग्नेटो जीवाश्म नरिमाण में योगदान दयिा ।

मैग्नेटोफॉसलिस कय्या हैं?

- **परचिय:**
 - "मैग्नेटोफॉसलिस" मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया (**Magnetotactic Bacteria**) के जीवाश्म अवशेषों को संदर्भति करता है जनिमें चुंबकीय खनजि होते हैं ।
 - मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया भूवैज्ञानिक रकिॉर्ड में **जीवाश्म युक्त चुंबकीय कण** उत्सर्जति करते हैं ।
- **मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया:**
 - मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया ज़यादातर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो स्वयं को **पृथ्वी के चुंबकीय कषेत्र** के साथ व्यवसथति करते हैं । इसकी खोज वर्ष **1963** में **सालवाटोर बेलनि** ने की थी ।
 - ये जीव उन सथानों तक पहुँचने के लयि **चुंबकीय कषेत्र का अनुसरण करते हैं जहाँ इष्टतम ऑक्सीजन सांद्रता होती** है । यह प्रक्रयिा उनकी कोशकियाओं के भीतर **लौह-समृद्ध क्रसिटल** की उपसथति से सुगम होती है ।
 - मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया जल नकियाँ में बदलते ऑक्सीजन स्तर और तलछट संतृप्ति को नेवगि करने के लयि अपनी कोशकियाओं के भीतर **मैग्नेटाइट या ग्रेगाइट के छोटे क्रसिटल** बनाते हैं ।
 - मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के भीतर क्रसिटल **मैग्नेटोटेक्ससि** के माध्यम से एक **शृंखला वनियस** में व्यवसथति होते हैं ।

- **दुर्लभ वशाल मैग्नेटो जीवाश्म पारंपरिक चुंबकीय जीवाश्मों** की तुलना में इतने आम नहीं हैं, ये संभवतः बैक्टीरिया के बजाय **यूकेरियोट्स** द्वारा निर्मित होते हैं।
- **मैग्नेटोफॉसिलिस की उत्पत्ति:**
 - अधिकांश वशाल मैग्नेटोफोसिलिस दो भूवैज्ञानिक समय अवध **पैलियोसीन-इओसीन थर्मल मैक्सिमम (लगभग 56,000 मलियन वर्ष पहले)** और **मडिलि इओसीन क्लाइमैटिक ऑप्टिमम (लगभग 40 मलियन वर्ष पहले)** के तलछट में पाए गए हैं, जो दोनों समयों पर वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिये जाने जाते थे।
 - इसने सुझाव दिया कि मैग्नेटोफॉसिलिस का निर्माण केवल ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान हुआ।
 - बंगाल की खाड़ी से वशाल मैग्नेटो जीवाश्मों की खोज लगभग **50,000 साल पहले, अंतिम क्वार्टनरी काल (late Quaternary Period)** से हुई थी, जिससे वे अब तक खोजे गए **सबसे कम उम्र के वशाल मैग्नेटो जीवाश्म** बन गए।
 - वर्तमान अध्ययन इस धारणा को चुनौती देता है कि मैग्नेटोफॉसिलिस का निर्माण ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान हुआ था।




प्रोकैरियोट्स	यूकेरियोट्स
<ul style="list-style-type: none"> ■ प्रोकैरियोट्स ऐसे जीव हैं जिनमें नाभिकी और झल्लियुक्त अंगों की कमी होती है। <ul style="list-style-type: none"> ◦ उनके आनुवंशिक पदार्थ, गोलाकार डी.एन.ए. अणु, एक परमाणु झल्लिी के भीतर संलग्न हुए बना कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। ■ प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल हैं। ■ मुख्य वशिषताओं में नाभिकी या अंग के बिना छोटी, सरल कोशिकाएँ शामिल हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ यूकेरियोट्स ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक झल्लिी के भीतर नाभिकी युक्त कोशिकाएँ होती हैं। <ul style="list-style-type: none"> ◦ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में वभिन्न प्रकार के झल्लिी-बद्ध अंगक होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और आंतरिक झल्लिी का एक जटिल नेटवर्क। ■ यूकेरियोट्स में सभी प्रकार के जानवर, पौधे और कवक शामिल हैं। ■ मुख्य वशिषताओं में केंद्रक युक्त वृहद जटिल कोशिकाएँ और वभिन्न अंगक शामिल हैं।

Prokaryotic Cells



Eukaryotic Cells



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. शब्द 'डेनिसोवन (Denisovan)' कभी-कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? (2019)

- (a) एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म
- (b) एक आदिमिनव जाति (स्पीशीज़)
- (c) पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र
- (d) भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. मैग्नेटोफॉसिलिस और उनके निर्माण में मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया की भूमिका पर चर्चा कीजिये