

अमेरिका में शीतकालीन तूफान

प्रलम्बिस के लयि:

अमेरिका में शीतकालीन तूफान, हाइपोथर्मिया, बर्फीला तूफान, धरुवीय चक्रवात, आर्कटकि ।

मेन्स के लयि:

अमेरिका में शीतकालीन तूफान, वायुमंडल संरचना और संघटन, तापमान, पवन प्रणाली, बादल तथा वर्षा के प्रकार ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यौं?

अमेरिका में शीतकालीन तूफान इसने कई प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं, जससे वभिन्न राज्य शून्य से नीचे तापमान, हमिपात से परभावति हुए हैं ।

- इस स्थिति के परिणामस्वरूप जनवरी 2024 में मुख्य रूप से हाइपोथर्मिया या सडक दुर्घटनाओं के कारण देश भर में कुल 72 मौतें हुई ।


अमेरिका में भयंकर शीतकालीन तूफानों के कौन-से कारक हैं?

■ धरुवीय चक्रवात:

- धरुवीय चक्रवात पृथ्वी के दोनों धरुवों के आसपास कम दबाव और टंडी वायु का एक बड़ा कषेत्र है ।
- "चक्रवात" शब्द वायु के वामावर्त प्रवाह को संदर्भति करता है जो धरुवों के पास टंडी वायु को बनाए रखने में मदद करता है । यह धरुवों पर हमेशा मौजूद होता है तथा गर्मियों में कमजोर पडता है, जबकि सर्दियों में प्रबल हो जाता है ।
 - कभी-कभी, धरुवीय भँवर में व्यवधान से संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण की ओर बढ़ने वाली टंडी वायुओं से तापमान में गरिावट आ जाती है ।
 - आर्कटकि में जलवायु परिवर्तन, आर्कटकि प्रवर्धन नामक एक घटना की ओर ले जाता है । आर्कटकि ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है । आर्कटकि में बढी हुई गर्मी धरुवीय चक्रवात को कमजोर कर देती है, जससे यह व्यवधानों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है ।
 - कमजोर होने से धरुवीय चक्रवात में वसितार हो सकता है या यह वभिजति हो सकता है,जससे टंडी आर्कटकि वायु का वसितार दक्षिण की ओर हो सकता है ।

The Science Behind the Polar Vortex

The polar vortex is a large area of low pressure and cold air surrounding the Earth's North and South poles. The term vortex refers to the counterclockwise flow of air that helps keep the colder air close to the poles (left globe). Often during winter in the Northern Hemisphere, the polar vortex will become less stable and expand, sending cold Arctic air southward over the United States with the jet stream (right globe). The polar vortex is nothing new — in fact, it's thought that the term first appeared in an 1853 issue of E. Littell's *Living Age*.



■ आर्कटिक वायु द्रव्यमान:

- अमेरिका में [आर्कटिक](#) वायुराशियों की घुसपैठ से तापमान में तेज़ी से गिरावट आ सकती है। ये वायु द्रव्यमान आर्कटिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और दक्षिण की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे उन क्षेत्रों में अधिक ठंड की स्थिति आ सकती है जो इस तरह की चरम सीमा के आदी नहीं हैं।

■ जेट स्ट्रीम प्रतरूप:

- जेट स्ट्रीम, वायुमंडल में एक पट्टीनुमा क्षेत्र में तेज़ प्रवाहति होने वाली वायु, मौसम प्रणालियों को संचालित करने में भूमिका निभाती है।
- जेट स्ट्रीम प्रतरूप में परिवर्तन से आर्कटिक से ठंडी वायु दक्षिण की ओर बढ़ जाती है, जिससे देश का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो जाता है।

शीतकालीन तूफान क्या हैं?

■ परिचय:

- शीतकालीन तूफान मौसमी घटनाएँ हैं जिनमें अत्यधिक ठंडे तापमान, हमि, ओलावृष्टि के रूप में वर्षा होती है और अक्सर तेज़ हवाएँ चलती हैं।
- ये तूफान सामान्य दैनिक गतिविधियों को बाधित कर सकते हैं, परिवहन को प्रभावित कर सकते हैं और समुदायों के लिये विभिन्न खतरे पैदा कर सकते हैं।

■ शीतकालीन तूफान की उत्पत्ति:

- नम वायु का बढ़ना: शीत ऋतु के तूफानों की शुरुआत वातावरण में नम वायु बढ़ने के साथ होती है। यह ठंडे मौसम में हो सकता है जहाँ गर्म वायु ठंडी वायु से ऊपर उठ जाती है या जब वायु किसी बड़ी पहाड़ी या पर्वत की ओर बढ़ती है।
- नमी का स्रोत: बादल निर्माण और वर्षा के लिये नमी का स्रोत आवश्यक है। यह जल के बड़े निकायों, जैसे— झीलों या महासागरों में बहने वाली वायु द्वारा, जल वाष्प को उठाकर प्रदान किया जा सकता है।
- ठंडी वायु: शीतकालीन तूफानों को अलग करने वाला प्रमुख कारक शीत वायु की उपस्थिति है। जब ज़मीन के पास और पूरुवायुमंडलीय परतों में तापमान शून्य से नीचे होता है, तो बर्फ या बरफ के रूप में वर्षा होती है।

■ शीतकालीन तूफान के प्रकार:

- हमिनी तूफान(Snowstorms): ये ऐसे तूफान हैं, जिनमें वर्षा मुख्यतः हमि के रूप में गरिती है। हमि के टुकड़े तब बनते हैं, जब जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है और जम जाती है। पवनों का तापमान यह निर्धारित करता है कि वर्षा, हमि के रूप में गरिती है या नहीं।

- **ब्लिज़र्ड्स(Blizzards):** हमि की मात्रा के स्थान पर तीव्र पवनों से परभाषति, ब्लिज़र्ड्स में वायु की गति 35 MPH (मील प्रति घंटा) या उससे अधिक होती है। ब्लिज़र्ड्स में हमि से युक्त पवनों की स्थिति पैदा होती है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और हमि के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं।
- **झील प्रभाव वाले तूफान(Lake Effect Storms):** ये तूफान ग्रेट लेक्स (USA) से नमी की प्रचुरता के कारण बनते हैं। झीलों के ऊपर से गुजरने वाली ठंडी, शुष्क पवनें जलवाष्प एकत्रित करती है, जिससे झीलों के दक्षिण और पूर्व के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है।
- **बर्फीले तूफान(Ice Storms):** यह बाहरी सतहों पर कम-से-कम 0.25 इंच बर्फ जमा होने वाले शीतकालीन तूफान हैं। बर्फीले तूफान ज़मीन पर चिकनी परत का निर्माण कर देते हैं, जिससे यात्रा करना और पैदल चलने में समस्या होती है। वे पेड़ की शाखाओं और विद्युत तारों के टूटने का कारण भी बन सकते हैं।

हाइपोथर्मिया क्या है?

परिचय:

- जब शरीर स्वयं से गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता से अधिक तेज़ी से गर्मी खो देता है तो शरीर का तापमान गंभीर रूप से कम हो जाता है जिसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। यह एक चिकित्सा संबंधी आपातकाल स्थिति को दर्शाता है।
- शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फारेनहाइट (37 डिग्री सेल्सियस) होता है तथा हाइपोथर्मिया आमतौर पर तब शुरू होता है जब शरीर का तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट (35 डिग्री सेल्सियस) से कम हो जाता है।
- शीत के संपर्क में आने से कई कारकों के संयोजन से हाइपोथर्मिया हो सकता है जो शरीर के मूल तापमान को बनाए रखने की क्षमता को बाधित करता है।
- शीत की स्थिति में शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया गर्मी उत्पन्न करना तथा गर्मी को संरक्षित करना है जो मुख्य रूप से स्मैसतषिक में हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है।

लक्षण:

- कँपकँपी, जो हाइपोथर्मिया बढ़ने पर रुक सकती है। (कंपकंपी वास्तव में एक सकारात्मक संकेत है जो दर्शाता है कि आपकी ताप नियमिति करने वाली प्रणालियाँ अभी भी सक्रिय हैं)।
- धीमी, उथली श्वास।
- भ्रम और स्मृतनाश।
- उनीदापन या थकावट।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. अंटार्कटिक क्षेत्र में ओज़ोन छदिर का होना चिता का कारण रहा है। इस छदिर के बनने का कारण क्या होगा? (2011)

- प्रमुख क्षोभमंडलीय वकिषोभ की उपस्थिति; और क्लोरोफ्लोरो कार्बन का अंतरवाह।
- प्रमुख ध्रुवीय वाताग्र और समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति; तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन का अंतरवाह।
- ध्रुवीय वाताग्र और समतापमंडलीय बादलों की अनुपस्थिति; तथा मीथेन एवं क्लोरोफ्लोरो कार्बन का वाताग्र।
- वैश्विक तापन के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान में वृद्धि।

उत्तर: (b)

- सर्दियों के अंत तथा वसंत की शुरुआत में अंटार्कटिक में समतापमंडलीय ओज़ोन परत के गंभीर क्षरण को 'ओज़ोन छदिर' के रूप में जाना जाता है।
- सर्दियों के मौसम में अंटार्कटिक क्षेत्रों में नचिले समताप मंडल में वायु का तापमान बेहद कम होता है। ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघ (PSC) ध्रुवीय ओज़ोन परत में तब बनते हैं जब सर्दियों में न्यूनतम तापमान - 78 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। अंटार्कटिक में ऐसा औसतन लगभग 5 से 6 माह तक होता है।
- इसके अतिरिक्त PSC में मौजूद नाइट्रिक एसडि CFC के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन बनाता है जो ओज़ोन के फोटोकैमिकल वनिाश को उत्प्रेरित करता है।
- हैलोजन गैसों मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ऊपरी क्षोभमंडल से समताप मंडल में प्रवेश करती हैं तथा इन्हें समतापमंडलीय वायु गति के माध्यम से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है।
- इसके अतिरिक्त सर्दियों के माह में अंटार्कटिक क्षेत्र में समतापमंडलीय वायु लंबे समय तक अपेक्षाकृत पृथक रहती है क्योंकि तीव्र पवन अंटार्कटिक को घेर लेती हैं, जिससे एक ध्रुवीय भंवर उत्पन्न होता है जो ध्रुवीय समतापमंडल के अंदर अथवा बाहर वायु की पर्याप्त गति को बाधित करता है।

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

??????:

प्रश्न1. हर्मांक-मंडल (करायोस्फेर) वैश्वकल जलवायु को कसल प्रकार प्रभावतल करता है? (2017)

प्रश्न2. आर्कटकल की बरूफ और अंटार्कटकल के ग्लेशयरल कल पघलना कसल तरह अलग-अलग ढंग से पृथूवी पर मौसम के स्वरूप तथा मनुष्य की गतवलधलरल पर प्रभाव डालते हैं? स्पष्ट कीजयल। (2021)

प्रश्न3. भारत आर्कटकल प्रदेश के संसाधनल में कसल प्रकार गहन रुची ले रहा है? (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/winter-storms-in-the-us>

